

Pour connaître nos adresses et les différents services qui y sont offerts, contactez la succursale de votre région ou visitez notre site web.

For our addresses and the different services offered, please contact our nearest branch or visit our website.

www.groupemedicus.ca



Medicus

Montréal

514 525-3757 | 1 866 525-3757

Savard

Membre du
Groupe Médicus

Québec

418 681-6381 | 1 800 463-6436

**Medicus
OXYBEC**

Sherbrooke

819 566-8711 | 1 800 361-9911

GRUPE MÉDICUS
fièrement accrédité



AOPQ
ORTHÉSISTES PROTHÉSISTES
ASSOCIATION DES ORTHÉSISTES
ET DES PROTHÉSISTES DU QUÉBEC

MEMBRE DE L'ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

Medicus Savard OXYBEC

Corset d'immobilisation (Type TAYLOR BRACE)



ORTHÈSES



Groupe
Medicus

ENTRETIEN

Le corset se lave à la machine à laver. Laissez sécher le corset à l'extérieur ou à plat sur une serviette.

Lors du lavage du corset, demeurez au lit, à plat, sans oreiller et demandez de l'aide afin de vous tourner en bloc.

Ce document est à titre éducatif et informatif seulement. Toujours vous référer aux instructions et/ou à votre professionnel de la santé.

Corset d'immobilisation (Type TAYLOR BRACE)

Le produit sert à immobiliser
le tronc (colonne dorsale
et lombaire).

Retirez
le corset seulement
en position couchée.

Gardez un T-shirt ou une camisole
en permanence sous le corset
afin de protéger la peau.

Hygiène personnelle

Couchez-vous sur le dos.

Remarquez bien les endroits où se situent les bords du corset (exemple : sous les seins, sur l'os de la hanche) afin de repositionner le corset au bon endroit, s'il se déplace.

1. Examinez attentivement l'état de la peau.
2. Lavez et asséchez la peau soigneusement.
3. Appliquez de la poudre, si désiré.
4. Remettez le corset en l'ajustant bien, car il remontera en position assise.

Manipulation

Comme tous les corsets pour le tronc, le corset de type Taylor a tendance à monter sur le corps. Il est donc primordial de le positionner au bon endroit.

Placez le corset très bas. Le bas de la tige postérieure qui s'appuie sur les fesses devrait être positionné au milieu des fesses. Un corset Taylor placé trop bas ne cause jamais de problème, car ce dernier remonte dans les heures qui suivent l'installation.

Portez un corset
en permanence pour s'asseoir,
se lever ou pour circuler s'il n'y a pas
de déficit neurologique.