


Attelle thoraco-brachiale (Type SWATHE)

H-9006-00



ORTHÈSES



Groupe
Medicus

Pour connaître nos adresses
et les différents services qui y sont
offerts, contactez la succursale de
votre région ou visitez notre site web.

*For our addresses and the different
services offered, please contact our
nearest branch or visit our website.*

www.groupemedicus.ca



Medicus

Montréal

514 525-3757 | 1 866 525-3757

Savard

Membre du
Groupe Medicus

Québec

418 681-6381 | 1 800 463-6436

Medicus OXYBEC

Sherbrooke

819 566-8711 | 1 800 361-9911

GRUPE MÉDICUS
fièrement accrédité



AOPQ
ORTHÉSISTES PROTHÉSISTES
ASSOCIATION DES ORTHÉSISTES
ET DES PROTHÉSISTES DU QUÉBEC

MEMBRE DE L'ORDRE DES
TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS
DU QUÉBEC

ENTRETIEN

L'attelle ne se lave pas. Si elle est trop souillée,
vous devez en obtenir une nouvelle dans l'un
de nos laboratoires.

Ce document est à titre éducatif
et informatif seulement.
Toujours vous référer aux
instructions et/ou à votre
professionnel de la santé.

Attelle thoraco-brachiale (Type SWATHE)

Le produit sert à immobiliser
le bras près du corps.
L'attelle est souvent utilisée lors
des luxations de l'épaule.

Hygiène personnelle

Examinez bien la façon dont l'attelle est installée avant de l'enlever.

Demandez de l'aide au besoin pour enlever l'attelle.

Lavez l'aisselle à tous les jours et bien assécher.
Appliquez un déodorant.



Installez l'attelle en suivant ces étapes

1. Glissez le bras dans le manchon en le supportant.
2. Passez les courroies par-dessus les épaules et assurez-vous qu'elles se croisent dans le dos (voir photo).
3. Collez les courroies sur le manchon et ajustez la tension pour garder le bras à 90 degrés.

Si recommandé par votre spécialiste de la santé, placez la courroie faisant le tour du corps. Cette courroie sert à stabiliser le bras le long du corps.

- Collez une des extrémités sur le manchon.
- Passez par-dessus le bras blessé et sous le bras sain.
- Collez le velcro sur la courroie à l'endroit désiré.
- Si la courroie du corps est trop courte, contactez l'un de nos laboratoires; il est possible de la rallonger.

L'attelle est portée
en moyenne
de trois à quatre semaines.